

CARTE D'ALERTE D'URGENCE

SYNDROME DE LOEYS-DIETZ

(*Trouble héréditaire du tissu conjonctif*)

Cette personne présente UN RISQUE de :

- **DISSECTION AORTIQUE ET ARTÉRIELLE**
(de la tête au bassin)
- **PNEUMOTHORAX**
- **RUPTURE D'UN ORGANE CREUX**
- **DÉCOLLEMENT DE LA RÉTINE**

DÉPLIEZ POUR PLUS D'INFORMATIONS

MÉDICAMENTS ACTUELS

	DOSE	FRÉQUENCE

INTERVENTIONS CHIRURGICALES : (PRÉCÉDENTES ET À VENIR)

NOM DE L'INTERVENTION CHIRURGICALE	DATE

PLUS D'INFORMATIONS MÉDICALES

- Cette personne peut présenter une **FRAGILITÉ DES TISSUS** : il convient d'être extrêmement prudent lors du transport vers l'hôpital et à l'hôpital. Cependant, les tissus ne sont pas trop fragiles pour une intervention chirurgicale.
- **AUTRES COMPLICATIONS D'URGENCE** : tamponnade cardiaque, choc hémorragique, ectopie du cristallin, hémoptysie et, pendant la grossesse : risque élevé d'événements vasculaires, rupture utérine.
- Informations destinées aux PROFESSIONNELS DE SANTÉ sur le syndrome de Loeys-Dietz :



CONTACTEZ-NOUS

1-888-LDS-FCAN
www.loeysdietzcanada.org



INFORMATIONS DU PATIENTS

- STIMULATEUR CARDIAQUE
 VALVE MÉCANIQUE
 LENTILLES DE CONTACT
 ANTICOAGULANT(S)

ANÉVRISMES ACTUELS :

- VOIES RESPIRATOIRES DIFFICILES
 RÉPARATION
 AORTIQUE PRÉCÉDENTE
 INSTABILITÉ DE LA COLONNE CERVICALE

Si la colonne cervicale est instable, procéder avec précaution lors de l'intubation afin d'éviter toute luxation.

NOM DE LA PERSONNE À CONTACTER EN CAS D'URGENCE
(RELATION) :

NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE 1 :

NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE 2 :

NOM COMPLET :

DATE DE NAISSANCE :

GROUPE SANGUIN :

NUMÉRO DE CARTE DE SANTÉ :

ALLERGIES (RÉACTIONS) :

Pour traiter les réactions allergiques : Utilisez d'abord un antihistaminique. En raison de son effet sur le système circulatoire, n'utilisez l'injecteur d'épinéphrine que dans les cas où la vie du patient est en danger.

DÉPLIEZ POUR PLUS D'INFORMATIONS

SYMPTÔMES D'URGENCE ET RECOMMANDATIONS EN CAS D'URGENCE, évaluez rapidement :	MÉDICAMENTS : DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES																
<p>DISSECTION AORTIQUE OU ARTÉRIELLE (DE LA TÊTE AU BASSIN) : Les services d'urgence doivent être appelés et le patient doit subir un examen d'imagerie (Angiométrie, IRM et échocardiographie) à l'hôpital le plus proche afin de confirmer ou d'informer la dissection.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">NOM DU MÉDICAMENT</th> <th style="width: 50%;">PRESCRIT PAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NOM DU MÉDICAMENT	PRESCRIT PAR														
NOM DU MÉDICAMENT	PRESCRIT PAR																
<p>Les symptômes comprennent une douleur soudaine et intense dans la poitrine ou l'abdomen et une douleur irradiant dans la poitrine, l'abdomen, le dos et/ou les extrémités. Autres symptômes : étourdissements, événements, essoufflement, transpiration excessive, confusion, pouls faible et rapide ou impossibilité de trouver un pouls dans les extrémités, hypotension artérielle/différence de 20 mmHg entre les bras, nausées, vomissements, bruits cardiaques étouffés ou souffle cardiaque diastolique, ou symptômes d'accident vasculaire cérébral (difficulté soudaine à parler, engourdissement, faiblesse, paralysie d'un côté du corps). La dissection peut mettre la vie en danger et nécessite des soins immédiats.</p>	<p>Évitez l'utilisation de stimulants et de vasoconstricteurs. Évitez l'utilisation de fluoroquinolones, sauf s'il n'existe aucune alternative efficace pour traiter une infection grave. Pour plus d'information sur les recommandations en matière de médicaments, scannez le code QR.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>																
<p>PNEUMOTHORAX SPONTANÉ : Les symptômes comprennent une douleur aiguë dans la poitrine, l'épaule, le dos ou le cou, aggravée par la toux ou une inspiration profonde. La douleur peut entraîner des difficultés respiratoires et un événement des narines. La peau peut présenter une teinte bleutée et des étourdissements peuvent être suivis d'un choc ou d'un collapsus. Peut être causé par la rupture de bulles pulmonaires.</p>	<p>RUPTURE D'UN ORGANE CREUX : L'intestin, la rate ou l'utérus peuvent se déchirer ou se rompre. Les symptômes d'une rupture intestinale comprennent des ballonnements, des crampes abdominales sévères, une douleur ou une sensibilité au toucher de l'abdomen, de la fièvre, des frissons, des nausées et des vomissements. Une rupture de la rate provoque une douleur intense dans l'épaule gauche/la partie supérieure gauche de l'abdomen, une sensibilité au toucher de l'épaule/de l'abdomen, une confusion, des étourdissements et des vertiges. La rupture utérine survient principalement pendant la grossesse.</p>																
<p>DÉCOLLEMENT DE LA RÉTINE : Les symptômes comprennent une vision soudainement floue ou la présence de points, de lignes, d'éclairs lumineux ou des ombres qui se déplacent. Non traité, le décollement de la rétine peut entraîner la cécité.</p>	<p>AUTRES DIAGNOSTICS ET INFORMATIONS</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>																
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ																	
SPÉCIALITÉ <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	NOM <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	HÔPITAL/CLINIQUE <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	TÉLÉPHONE <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	FAX <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>													


Carte d'alerte d'urgence pour le syndrome de Loeys-Dietz

Cette carte est **facile à utiliser** et pourrait **vous sauver la vie**. Pour l'utiliser :

1. Imprimez les pages 1 et 2 de ce document en recto-verso et remplissez les deux pages à la main. Vous pouvez également remplir les pages 1 et 2 à l'aide d'Adobe Acrobat, puis les imprimer en recto-verso. Si vous avez des doutes concernant certaines informations, demandez conseil à votre médecin.
2. À l'aide des images ci-dessous, découpez les contours pleins de la carte. Ensuite, pliez la carte le long des lignes pointillées.
3. Gardez cette carte sur vous, dans votre portefeuille ou avec vos pièces d'identité.
4. Informez vos amis et votre famille que vous possédez une carte d'alerte et qu'elle doit être présentée aux professionnels de santé en cas d'urgence.
5. Si vos informations médicales changent, mettez votre carte à jour.


Pour plier cette carte :

1



Après avoir rempli les pages 2 et 3, imprimez-les en recto-verso, puis découpez le long du bord plein de la carte.

2



Placez la carte de manière à ce que la section « carte d'alerte d'urgence » soit tournée vers le haut et se trouve dans le coin supérieur de la page.

Puis pliez la carte en deux en suivant la ligne pointillée verticale au milieu de la page.

3



Pliez la carte en trois parties en suivant les deux lignes pointillées horizontales.

La carte pliée doit maintenant présenter la section « carte d'alerte d'urgence » d'un côté, et la section « informations sur le patient » avec le nom complet, la date de naissance, etc. de l'autre côté.

Avertissement : la carte d'alerte d'urgence est destinée à aider à transmettre des informations relatives au syndrome de Loeys-Dietz et à une personne. Elle ne remplace pas le dossier médical de la personne.